Bollettino dei pollini - Silandro

aggiornato il 29.03.2017

Situazione generale e previsioni per i prossimi giorni:

Lo spettro pollinico è caratterizzato da betulla, pioppo, cupressacee/taxacee, frassino comune, salice, carpino nero e olmo.

CONCENTRAZIONI RILEVATE NEL PERIODO: 20.03.2017 - 26.03.2017

Polline

tipo di polline	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	carica	p/m³	tendenza
BETULLA	alta	alta	alta	alta	alta	alta	alta	alta	266.9	↔
PIOPPO	alta	alta	alta	alta	alta	alta	alta	alta	161.9	↓
CUPRESSACEE / TAXACEE	media	media	media	bassa	bassa	media	media	media	39.1	↔
FRASSINO COMUNE	media	media	media	media	media	media	alta	media	16.7	↔
SALICE	bassa	bassa	bassa	bassa	bassa	bassa	bassa	bassa	8.1	↔
CARPINO NERO	non rilevata	bassa	bassa	bassa	bassa	bassa	media	bassa	5.6	↑
OLMO	bassa	bassa	bassa	bassa	bassa	bassa	bassa	bassa	5.5	↓
CIPERACEE	non rilevata	non rilevata	non rilevata	non rilevata	non rilevata	non rilevata	non rilevata	assente	1.6	↔
ACERO AMERICANO	bassa	bassa	bassa	bassa	non rilevata	non rilevata	bassa	bassa	1.3	↔
GRAMINACEE	bassa	bassa	non rilevata	non rilevata	non rilevata	bassa	bassa	bassa	0.7	↔
NOCCIOLO	bassa	bassa	bassa	non rilevata	non rilevata	non rilevata	non rilevata	assente	0.5	↓
ONTANO	bassa	bassa	non rilevata	non rilevata	non rilevata	non rilevata	non rilevata	assente	0.3	↓

Spore fungine

tipo di spora	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	carica	p/m³	tendenza
ALTERNARIA	bassa	bassa	bassa	non rilevata	non rilevata	bassa	bassa	bassa	3.3	↔

Legenda

Concentrazione:

assente-molto bassa	bassa	media	alta	non rilevata

Carica (media settimanale):

= assente - molto bassa	= bassa	= media	= alta

Tendenza:

= stazionaria	= in diminuzione	= in aumento

p/m³:
media su sette giorni (espressa in pollini o spore fungine per metro cubo d'aria)

© Laboratorio biologico
Agenzia provinciale per l'ambiente
Provincia Autonoma di Bolzano
Riproduzione e diffusione parziale o totale autorizzate solo con citazione della fonte