



## Bollettino dei pollini - Bolzano

aggiornato il 27.02.2018

### Situazione generale e previsioni per i prossimi giorni:

Lo spettro pollinico nell'aria è caratterizzato da cupressacee, olmo e ontano. I pollini di nocciolo raggiungono concentrazioni da medie ad alte. Sono stati inoltre rilevati alcuni pollini di acero saccharino. L'abbassamento delle temperature di questi giorni ritarderà la fioritura del pioppo. Non si prevedono variazioni nello spettro pollinico.

### CONCENTRAZIONI RILEVATE NEL PERIODO: 19.02.2018 - 25.02.2018

#### Polline

tipo di polline	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	carica	p/m <sup>3</sup>	tendenza
CUPRESSACEE / TAXACEE	alta	alta	alta	alta	alta	alta	alta	☹️	165.2	↔️
OLMO	alta	alta	alta	alta	alta	alta	alta	☹️	59.3	↓
ONTANO	alta	alta	alta	alta	alta	alta	alta	☹️	50.5	↓
NOCCIOLO	media	media	media	media	alta	alta	alta	😐	35.7	↔️
ACERO SACCHARINO								😊	0.3	↔️

#### Spore fungine

tipo di spora	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	carica	p/m <sup>3</sup>	tendenza
ALTERNARIA	media	😐	3.3	↔️						

### Legenda

#### Concentrazione:

assente-molto bassa	bassa	media	alta	non rilevata
---------------------	-------	-------	------	--------------

#### Carica (media settimanale):

😊 = assente - molto bassa	😐 = bassa	😐 = media	☹️ = alta
---------------------------	-----------	-----------	-----------

#### Tendenza:

↔️ = stazionaria	↓ = in diminuzione	↑ = in aumento
------------------	--------------------	----------------

#### p/m<sup>3</sup>:

media su sette giorni (espressa in pollini o spore fungine per metro cubo d'aria )