



Bollettino dei pollini - Silandro

aggiornato il 11.04.2018

Situazione generale e previsioni per i prossimi giorni:

Lo spettro pollinico è determinato da pioppo e betulla. Si segnala inoltre la presenza di cupressacee, carpino nero e frassino comune. La fioritura di nocciolo, olmo e ontano è terminata e le loro concentrazioni polliniche scenderanno. I pollini di salice e graminacee raggiungono solo concentrazioni basse.
Il maltempo abbasserà temporaneamente le concentrazioni polliniche nell'aria; con il migliorare delle condizioni meteorologiche la carica pollinica tenderà nuovamente ad aumentare.

CONCENTRAZIONI RILEVATE NEL PERIODO: 02.04.2018 - 08.04.2018

Polline

tipo di polline	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	carica	p/m ³	tendenza
PIOPPO								☹	223.1	↔
BETULLA								☹	187.6	↔
NOCCIOLO								☹	31.6	↓
CUPRESSACEE / TAXACEE								☹	23.4	↔
CARPINO NERO								☹	6.9	↑
FRASSINO COMUNE								☹	5.2	↔
OLMO								☹	4.2	↓
SALICE								☹	3.6	↔
ONTANO								☹	2.4	↓
GRAMINACEE								☹	0.7	↔

Spore fungine

tipo di spora	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	carica	p/m ³	tendenza
ALTERNARIA								☹	2.3	↔

Legenda

Concentrazione:

assente-molto bassa	bassa	media	alta	non rilevata
---------------------	-------	-------	------	--------------

Carica (media settimanale):

☺ = assente - molto bassa	☹ = bassa	☹ = media	☹ = alta
---------------------------	-----------	-----------	----------

Tendenza:

↔ = stazionaria	↓ = in diminuzione	↑ = in aumento
-----------------	--------------------	----------------

p/m³:

media su sette giorni (espressa in pollini o spore fungine per metro cubo d'aria)