



Bollettino dei pollini - Bolzano

aggiornato il 19.03.2019

Situazione generale e previsioni per i prossimi giorni:

Lo spettro pollinico è caratterizzato da cupressacee/taxacee e pioppo.

I pollini di olmo, acero americano, salice, nocciolo, ontano e frassino comune raggiungono solo concentrazioni da basse a molto basse.

Sono stati rilevati infine i primi pollini di carpino bianco e betulla.

Le buone condizioni meteorologiche continueranno a favorire la diffusione di pollini; nei prossimi giorni potrebbero volare anche i primi pollini di carpino nero.

CONCENTRAZIONI RILEVATE NEL PERIODO: 11.03.2019 - 17.03.2019

Polline

tipo di polline	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	carica	p/m ³	tendenza
CUPRESSACEE / TAXACEE								☹	264	↔
PIOPPPO								☹	57	↓
OLMO								☹	6.1	↓
ACERO AMERICANO								☹	5.2	↓
SALICE								☹	4.5	↔
NOCCIOLO								☹	2.1	↔
CARPINO BIANCO								☹	1.8	↔
ONTANO								☹	1.5	↓
BETULLA								☹	1.1	↑
FRASSINO COMUNE								☹	1	↑

Spore fungine

tipo di spora	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	carica	p/m ³	tendenza
ALTERNARIA								☹	2	↔

Legenda

Concentrazione:

assente-molto bassa	bassa	media	alta	non rilevata
---------------------	-------	-------	------	--------------

Carica (media settimanale):

😊 = assente - molto bassa	☹ = bassa	😐 = media	☹ = alta
---------------------------	-----------	-----------	----------

Tendenza:

↔ = stazionaria	↓ = in diminuzione	↑ = in aumento
-----------------	--------------------	----------------

p/m³:

media su sette giorni (espressa in pollini o spore fungine per metro cubo d'aria)