Bollettino dei pollini - Silandro

aggiornato il 17.06.2021

Situazione generale e previsioni per i prossimi giorni:

Lo spettro pollinico è determinato da graminacee, urticacee e pino. Volano inoltre i pollini di sambuco, poligonacee, ontano verde e cupressacee. Le concentrazioni polliniche di orniello sono in calo, mentre quelle di piantaggine e castagno tenderanno ad aumentare. Il tempo caldo-umido favorisce la presenza delle spore fungine nell'aria.

CONCENTRAZIONI RILEVATE NEL PERIODO: 07.06.2021 - 13.06.2021

Polline

tipo di polline	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	carica	p/m³	tendenza
GRAMINACEE	media	media	media	alta	alta	alta	alta	alta	77.2	↔
PINO	bassa	alta	alta	alta	alta	alta	alta	alta	68.5	↓
URTICACEE	bassa	bassa	bassa	media	media	media	media	media	25.5	↑
SAMBUCO	bassa	bassa	non rilevata	non rilevata	bassa	bassa	bassa	bassa	5.9	↔
POLIGONACEE	bassa	bassa	non rilevata	media	media	media	media	bassa	4.7	↔
ORNIELLO	bassa	media	bassa	bassa	bassa	media	bassa	bassa	3.7	↓
ONTANO	bassa	bassa	bassa	bassa	bassa	bassa	bassa	bassa	3.2	↔
CUPRESSACEE / TAXACEE	non rilevata	non rilevata	non rilevata	non rilevata	bassa	non rilevata	non rilevata	assente - molto bassa	2.1	↔
PIANTAGGINE	media	media	non rilevata	media	media	non rilevata	media	media	1	↑
CASTAGNO	non rilevata	non rilevata	non rilevata	non rilevata	non rilevata	non rilevata	bassa	assente - molto bassa	0.5	↑

Spore fungine

tipo di spora	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	carica	p/m³	tendenza
ALTERNARIA	bassa	media	media	media	media	media	media	media	11.7	↑

Legenda

Concentrazione:

assente-molto bassa	bassa	media	alta	non rilevata

Carica (media settimanale):

= assente - molto bassa	= bassa	= media	= alta

Tendenza:

= stazionaria	= in diminuzione	= in aumento

p/m³:
media su sette giorni (espressa in pollini o spore fungine per metro cubo d'aria)

© Laboratorio biologico
Agenzia provinciale per l'ambiente
Provincia Autonoma di Bolzano
Riproduzione e diffusione parziale o totale autorizzate solo con citazione della fonte