Bollettino dei pollini - Silandro

aggiornato il 04.05.2023

Situazione generale e previsioni per i prossimi giorni:

Lo spettro pollinico è caratterizzato da carpino nero, betulla, gelso della carta, cupressacee e quercia. Sono stati rilevati inoltre pollini di noce, salice, graminacee, frassino comune, urticacee, pino ed orniello. Si segnala anche la presenza di pollini di faggio e e poligonacee.

CONCENTRAZIONI RILEVATE NEL PERIODO: 24.04.2023 - 30.04.2023

Polline

tipo di polline	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	carica	p/m³	tendenza
CARPINO NERO	media	bassa	bassa	alta	alta	bassa	alta	molto alta	57.7	↓
BETULLA	media	bassa	bassa	bassa	bassa	bassa	media	media	16.9	↓
GELSO DELLA CARTA	bassa	assente	assente	media	media	assente	bassa	bassa	16.2	↓
CUPRESSACEE / TAXACEE	bassa	assente	bassa	bassa	bassa	bassa	media	bassa	15.9	↔
QUERCIA	bassa	bassa	bassa	media	bassa	bassa	media	bassa	14.9	↔
NOCE	bassa	bassa	bassa	bassa	bassa	bassa	bassa	bassa	6.9	↔
GRAMINACEE	bassa	bassa	bassa	bassa	bassa	assente	media	bassa	3.5	↑
URTICACEE	assente	assente	assente	bassa	bassa	assente	bassa	bassa	3.3	↔
PINO	assente	assente	assente	bassa	bassa	bassa	bassa	bassa	2.8	↑
ORNIELLO	assente	bassa	bassa	media	media	bassa	media	bassa	2.7	↑
FAGGIO	assente	assente	assente	bassa	bassa	assente	bassa	bassa	1.7	↔
POLIGONACEE	assente	assente	assente	assente	bassa	assente	assente	assente	0.3	↑

Legenda

Concentrazione:

assente-molto bassa	bassa	media	alta	non rilevata

Carica (media settimanale):

= assente - molto bassa	= bassa	= media	= alta

Tendenza:

↔ = stazionaria	↓ = in diminuzione	↑ = in aumento

p/m³:
media su sette giorni (espressa in pollini o spore fungine per metro cubo d'aria)

© Laboratorio biologico
Agenzia provinciale per l'ambiente
Provincia Autonoma di Bolzano
Riproduzione e diffusione parziale o totale autorizzate solo con citazione della fonte